

**RKI-Empfehlung für die Wiederezulassung in Schulen und sonstigen Gemeinschaftseinrichtungen**

Erkrankte				Erkrankung	Ausscheider und Kontaktpersonen		Maßnahmen	Allgemeines Merkblatt/Infos
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation			Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen		
ja	← Klinische Genesung/ 3 neg. Stuhlproben ←	← 1-3 (-8) d ←		<b>EHEC</b>	→ Ja, 3 negative Stuhlproben →	→ Nein, wenn keine Symptome, jedoch 3 neg. Stuhlproben →	Händehygiene, Lebensmittelhygiene www.maerkischer-kreis.de	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_ehec.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_ehec.pdf</a>
nein	← Antibiotika Therapie und klinische Genesung ←	← 2-4 (1-8) d ←		<b>Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis</b>	→ Nein, solange keine Symptome →	→ Nein, wenn klinische überwacht und Chemoprophylaxe durchgeführt wird →	Impfung laut STIKO; Rifampicin-Prophylaxe bei Kontaktpersonen	www.rki.de
Ja	← 24 h nach Beginn Antibiotikatherapie, sonst Abheilung Hautareale ←	← 2-10 d ←		<b>Impetigo contagiosa (Borkenflechte)</b>	→ entfällt →	→ nein →	Händehygiene, Wäschebehandlung bei 60°C.	www.rki.de
nein	← 5 d nach Beginn Antibiotikatherapie, sonst frühestens 3 Wochen nach Auftreten erster Symptome ←	← 7-14 (-20) d ←		<b>Keuchhusten</b>	→ entfällt →	→ Nein, wenn kein Husten →	Impfung laut STIKO, ggf. Gabe von Erythromycin bei Kontaktpersonen	www.rki.de
ja	← 3 mikroskopisch neg. Befunde von Sputum, Bronchialsekret oder Magensaft ←	← Wochen bis viele Monate ←		<b>Ansteckungsfähige Lungentuberkulose</b>	→ entfällt →	→ Nein, wenn keine Symptome, Kontrollmaßnahmen sind zu dulden →	Nach Infektionsquelle suchen	www.rki.de
nein	← Nach Abklingen der klinischen Symptome, frühestens 5 d nach Ausbruch Exanthem ←	← 8-10 (-14) d ←		<b>Masern</b>	→ entfällt →	→ Nicht erforderlich bei: vollem Impfschutz oder postexpositioneller Schutzimpfung oder nach durchgemachter Krankheit (ärztliche Bestätigung erforderlich), <b>sonst nach 14 d</b> →	Impfung nach STIKO, Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kindern	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_masern.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_masern.pdf</a>



**Cholera**  
**Diphtherie**  
**Virusbedingte hämorrhagische Fieber (VHF)**  
**Paratyphus/Typhus**  
**Pest**  
**Poliomyelitis**

Erkrankungen treten in Deutschland selten auf-  
 alle Maßnahmen erfolgen in Absprache mit  
 der Unteren Gesundheitsbehörde

Erkrankte			Erkrankung	Ausscheider und Kontaktpersonen		Maßnahmen	Allgemeines Merkblatt/Infos
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation		Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen		
nein	← Nach Genesung	← 3-4 (--10) d	<b>Meningokokken-Meningitis</b>	→ entfällt →	→ Nein, wenn medikamentöse Prophylaxe durchgeführt wird; →	Information und Beobachtung Kontaktpersonen STIKO beachten	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_meningitis.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_meningitis.pdf</a>
nein	← Frühestens 9 d nach Krankheitsbeginn; nach Abklingen der klinischen Symptome	← 16-18 (-25) d	<b>Mumps</b>	→ entfällt →	→ Nicht erforderlich bei Impfschutz, nach Riegelungsimpfung oder nach durchgemachter Krankheit; <b>sonst nach 18 d</b> →	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
Ja, zusätzlich nach vollständiger Milbenfreiheit	← Überlebende Milben dürfen nicht mehr in der Lage sein, einen neuen Krätzefall zu verursachen	← 2 – 6 Wochen	<b>Scabies</b>	→ entfällt →	→ Nein, wenn keine Symptome; Untersuchung aller Mitglieder der Wohngemeinschaft →	Effektive Behandlung der Haut; 2x/d Wäsche- und Handtuchwechsel u. a. Bekämpfungsmaßnahmen	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_skabies.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_skabies.pdf</a>
nein	← 24 h nach Beginn der antibiotischen Behandlung; sonst nach Abklingen der Symptome	← 2 -4 d	<b>Scharlach</b>	→ entfällt →	→ Nicht erforderlich, nur Aufklärung über Erkrankung →	Vermeiden des Kontaktes zu Erkrankten	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/Scharlach.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/Scharlach.pdf</a>
ja	← Nach klinischer Genesung und 3 negative Stuhlproben	← 12 – 96 h	<b>Shigellose</b>	→ Ja, 3 negative Stuhlproben →	→ Nein, wenn keine Symptome; in jedem Fall Nachweis 1 negative Stuhlprobe nach Beendigung der Inkubationszeit →	Effektive Händehygiene	www.rki.de
nein	← Isolierung des Erkrankten; 2 Wochen nach Auftreten erster Symptome bzw. 1 Woche nach Auftreten des Ikterus	← 25-30 d (-50) d	<b>Virushepatitis A oder E</b>	→ entfällt →	→ <b>4 Wochen;</b> Nicht erforderlich nach durchgemachter Krankheit, bei Impfungsschutz bzw. 1-2 Wochen nach Riegelungsimpfung →	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. nicht genügend geimpften Kontaktpersonen	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_hepatitis_a.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_hepatitis_a.pdf</a>
nein	← 1 Woche nach Krankheitsbeginn bei unkompliziertem Verlauf	← 14-16 (-28) d	<b>Windpocken</b>	→ entfällt →	→ Nein, allerdings Riegelungsimpfung für nicht Immune empfohlen; Vorsicht bei Schwangeren und Personen mit gestörter Immunitätslage →	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de
Bei wiederholtem Befall von 4 Wochen	← Nach der ersten von zwei erforderlichen Behandlungen	← Kein IKZ	<b>Kopflausbefall</b>	→ entfällt →	→ Nein, aber Kontrolluntersuchungen ggf. Behandlung →	Information zu Befall und zu effektiven Bekämpfungsmaßnahmen	<a href="http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_kopflaeuse.pdf">http://www.maerkischer-kreis.de/gesundheits_jugend_soiales/gesundheitschutz/info_kopflaeuse.pdf</a>

Erkrankte				Ausscheider und Kontaktpersonen			Allgemeines	
Ärztl. Attest	Zulassung nach Krankheit	Inkubation	Erkrankung	Ausschluss Ausscheider	Ausschluss Kontaktpersonen	Maßnahmen	Merkblätter, Infos	
nein	Noroviren: 48 h nach erstem geformten Stuhl Sonstige: Abklingen der Symptome	Stunden - Tage	<b>Nur für Kinder bis zum 6. Lebensjahr</b> <b>Virusenteritiden</b>	→ entfällt	→ Nein, wenn keine Symptome	Händehygiene	www.rki.de	
nein	Nach Abklingen des Durchfalls	Stunden - Tage	<b>Nur für Kinder bis zum 6. Lebensjahr</b> <b>Bakterielle Enteritiden</b>	→ entfällt	→ Nein, wenn keine Symptome	Händehygiene, Lebensmittelhygiene	www.rki.de	
<b>Empfehlungen zur Wiederzulassung in Gemeinschaftseinrichtungen, die nicht in den RKI-Empfehlungen zur Wiederzulassung genannt sind (≥ 2 Erkrankungen Meldung an Untere Gesundheitsbehörde)</b>								
Erkrankte				Ausscheider und Kontaktpersonen			Allgemeines	
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: 1 Woche nach Beginn des Exanthems	14 – 21d	<b>Röteln</b>	→ entfällt	→ Nein, allerdings Riegelungsimpfung für nicht Immune empfohlen; Vorsicht bei nicht immunen Schwangeren	Impfung nach STIKO; Riegelungsimpfung bei ungeimpften bzw. ungenügend geimpften Kontaktpersonen	www.rki.de	
ja, Augenarzt	Keine Vorschriften! Empfehlung: Dauer der Ausscheidung 2 bis 3 Wochen		<b>Ansteckende Bindehautentzündung</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen	Augenkontakt meiden, Händehygiene	www.rki.de	
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung	2-8 Tage	<b>Hand-Fuß-Mundkrankheit</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen	Händehygiene, meiden gemeinsames Besteck, Gläser etc		
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Bleibende Entfieberung, Temp für 24 Std. am Stück nicht über 37,5°C		<b>3-Tage Fieber</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen			
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung		<b>Mundfäule</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen	Händehygiene, meiden gemeinsames Besteck, Gläser etc.		
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung		<b>Pfeiffersches Drüsenfieber</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen			
nein	Keine Vorschriften! Empfehlung: Klinische Heilung		<b>Ringelröteln</b>	→ entfällt	→ Ausschluss bei Auftreten von Symptomen			